azienda sanitaria locale matera
U.O.S.D. Medicina Nucleare e Diagnostica PET-Tc
P.O. "Madonna delle Grazie"
Direttore: Dott. Saverio Schiavariello

SCHEDA RICHIESTA ESAME PET-COLINA

IL MODULO VA DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE. TRASMETTERE VIA FAX al n 0835-253673

N.B. PER PRENOTARE L'ESAME OCCORRE CONTATTARE DIRETTAMENTE IL REPARTO AL SEGUENTE NUMERO: 0835252002

_____

Cognome Nome Data di nascita

_____

Luogo di Residenza ricoverato (specificare ospedale e reparto) Telefono Paziente

_____

Medico Proponente Specificare istituzione Telefono/Fax

Quesito Clinico: DIAGNOSI ( ) STADIAZIONE INIZIALE ( ) RIPRESA BIOCHIMICA DI MALATTIA ( )

RISTADIAZIONE E/O VALUTAZIONE RISPOSTA A RADIO/CHEMIOTERAPIA/TERAPIA AORMONALE ( ) ALTRO

Anamnesi_____

_____

_____

Esami di diagnostica per immagini eseguiti (precisare ed allegare copia dei referti):_____

INTERVENTI CHIRURGICI SI' (Eseguito in data .....) NO ( )
RADIOTERAPIA SI' (Ultimo ciclo in data .....) NO ( )
CHEMIOTERAPIA SI' (Ultimo ciclo in data .....) NO ( )
ORMONOTERAPIA SI' (Ultimo ciclo in data .....) NO ( )
ALTRE TERAPIE SI' (Ultimo ciclo in data .....) NO ( )

PESO Kg. ..... ALTEZZA cm. ..... CLAUSTROFOBIA: (S I') NO ( ); ANSIETA' (SI') (NO)

_____
MEDICO PROPONENTE _____ li, _____.
(FIRMA - TIMBRO)

Note informative. La colina è un substrato della fosfatidilcolina, costituente della membrana cellulare. Le cellule tumorali, che proliferano rapidamente, sono caratterizzate da un aumentato uptake di colina che viene fosforilata dall'enzima colina-chinasi e intrappolata come fosfatidilcolina nelle cellule. Pertanto l'incorporazione della colina permette di ottenere una valutazione indiretta dell'indice di proliferazione cellulare".

Controindicazioni: Assolute ⏲ Gravidanza ⏲ In caso di PET/TC con mezzo di contrasto, reazioni allergiche al mezzo di contrasto iodato o creatininemia > 2 mg/dl. Relative ⏲ Incapacità del paziente a collaborare ⏲ Non osservanza del digiuno ⏲ Flogosi acuta (a seconda del quesito clinico)

Preparazione: è raccomandabile un digiuno di almeno 4 ore, evitare cibi contenenti colina (albume d'uovo, asparagi, fagioli, soia, carote, agnello, fegato di maiale e di vitello, latte scremato, arachidi, burro di arachidi, piselli, spinaci, cime di rapa e prodotti di grano) il giorno precedente l'esame, è opportuna una abbondante idratazione
- in caso di TC con mezzo di contrasto è necessario effettuare dosaggio della creatininemia ed ECG recente.