

BUPRENORFINA CONSENSUS CONFERENCE
MATERA 1° FEBBRAIO 2003

**“BUPRENORFINA:
ESPERIENZA NEL SER.T. DI
MATERA”**

D'Ambrosio L., Onorati N. P., Merolla E., Coscia D., Montemurro N.,
Petralla F., Sansò C., Pepe N.



OGGETTO DELLA RICERCA



- ◆ **Studio osservazionale dei trattamenti con buprenorfina nel periodo 1° marzo 2000 – 28 febbraio 2002 presso il Ser.T. di Matera**



OBIETTIVI



Valutazione retrospettiva dei trattamenti
rispetto a:

- ◆ **Ritenzione in trattamento**
- ◆ **Cause di fine trattamento**
- ◆ **Analisi dei dati di tossicologia urinaria**

CARATTERISTICHE POPOLAZIONE (1)

Classi d'età

- ◆ Pazienti: 79
- ◆ Sesso: (M) 77 (F) 2
- ◆ Età media: 29 anni
- ◆ Nuovi utenti: 41
- ◆ Vecchi utenti: 38

Classi	Frequenza	%
15-19 anni	1	1,3
20-24	11	13,9
25-29 anni	31	39,2
30-34 anni	26	32,9
35-39 anni	8	10,1
40-45 anni	2	2,5
Totale	79	100



CARATTERISTICHE POPOLAZIONE (2)



- ◆ N. Trattamenti: 109
- ◆ 100% pazienti senza terapia al momento dell'induzione
- ◆ Dosaggio Buprenorfina: 8-16 mg./die

CARATTERISTICHE POPOLAZIONE (3)

Criteri di inclusione al trattamento

- ◆ Tossicodipendenza di gravità intermedia (dipendenza fisica lieve; craving moderato)
- ◆ **Tossicodip. di breve durata**
- ◆ Discreto funzionamento psichico
- ◆ **Buona adattabilità sociale**
- ◆ Vissuto negativo verso la terapia con metadone

Criteri di esclusione al trattamento

- ◆ Pazienti con psicopatologie aggiuntive
- ◆ **Pazienti con dipendenze da alcool e/o abuso di benzodiazepine**
- ◆ Pazienti in gravidanza

DURATA TRATTAMENTI (1)


Durata trattamenti (escluso in corso al 28.2.03)

	Frequenza	Percentuale
<= 3 giorni	9	12,3
4 -30 giorni	21	28,8
31-90 giorni	16	21,9
91-180 giorni	7	9,6
181-360 giorni	12	16,4
> 360 giorni	8	11,0
Totale	73	100,0

Durata media: 130 giorni


- ♦ Il 41,1% dei tratt. **dura fino a 30 giorni**
- ♦ Il 37,0 % dei tratt. **dura più di 90 giorni**

DURATA TRATTAMENTI (2)




- ◆ I trattamenti dei vecchi pazienti hanno **durata inferiore** rispetto ai trattamenti dei nuovi
- ◆ **Maggiore ritenzione** in trattamento tra i nuovi utenti

DURATA TRATTAMENTI (3)




- ◆ **Pazienti anagraficamente più vecchi svolgono trattamenti più brevi**

CAUSE FINE TRATTAMENTO (1)



CAUSE FINE TRATTAMENTO (2)



- ◆ Delle 44 interruzioni di trattamento non concordate 20 si realizzano nei primi trenta giorni

ANALISI DEI DATI DI TOSSICOLOGIA URINARIA (1)

Durata trattamento	valore medio lac	valore medio lae
<= 30 giorni	0,59	0,72
31 - 90 giorni	0,7	0,77
91 - 180 giorni	0,76	0,8
181 - 360 giorni	0,75	0,82
> 360 giorni	0,82	0,85

Indice astinenza complessiva

Iac = n. esiti negativi esami toss. complessivi / n. totale esami toss.

Indice astinenza eroina

Iac = n. esiti negativi esami toss. eroina / n. totale esami toss.

Trattamenti: 98

(0 = astinenza nulla; 1 = totalmente astinente)

ANALISI DEI DATI DI TOSSICOLOGIA URINARIA (2)

Durata trattamenti	n° trattamenti	n° trattamenti con astinenza tutte le sostanze	n° trattamenti con astinenza eroina
31 - 90 giorni	16	6	9
91 - 180 giorni	13	5	8
181 -360 giorni	21	5	6
> 360 giorni	22	4	5
totale trattamenti	72	20	28

Trattamenti di
durata > 30
giorni in cui si
è riscontrata
una totale
astinenza:

- ♦ **20 %** da tutte
le sostanze
(eroina,
cocaina, THC)
- ♦ **28 %** da
eroina

ANALISI DEI DATI DI TOSSICOLOGIA URINARIA (2)

Durata trattamento	n° trattamenti	n° trattamenti con astinenza tutte le sostanze	n° trattamenti con astinenza eroina
<= 30 giorni	26	12	15
31 - 90 giorni	16	6	9
91 - 180 giorni	13	5	8
181 -360 giorni	21	5	6
> 360 giorni	22	4	5
totale trattamenti	98	32	43

Trattamenti in cui si
è riscontrata una
totale astinenza:

- ♦ **33 %** da tutte le
sostanze (eroina,
cocaina, THC)
- ♦ **44 %** da eroina

ANALISI DEI DATI DI TOSSICOLOGIA URINARIA (3)

Durata trattamenti	n. trattamenti	valore medio lac 90	valore medio lae 90
91 - 180 giorni	12	0,77	0,82
181 -360 giorni	21	0,78	0,9
> 360 giorni	22	0,84	0,93
totale trattamenti	55		

Indice astinenza complessiva nei primi 90 giorni di trattamento

Iac 90 = n. esiti negativi esami toss. complessivi / n. totale esami toss.

Indice astinenza eroina nei primi 90 giorni di trattamento

Iac 90 = n. esiti negativi esami toss. eroina / n. totale esami toss.

(0 = astinenza nulla; 1 = totalmente astinente)

CONCLUSIONI

Ritenzione in trattamento

- ◆ Dropping-out precoce (< 30 giorni trattamento)
- ◆ Migliore ritenzione tra i nuovi utenti e tra quelli di età compresa tra 25-29 anni

Cause di fine trattamento

- ◆ Interruzioni non concordate prevalentemente nei primi 30 giorni

Analisi dei dati di tossicologia urinaria

- ◆ Diminuzione del consumo di eroina, cocaina, THC
- ◆ Particolarmente significativa la riduzione del consumo di eroina
- ◆ La diminuzione del consumo, in particolare di eroina, si avvicina alla completa astinenza al crescere della durata del trattamento