



PROFILASSI FARMACOLOGICA RISONANZA MAGNETICA E TAC

PROFILASSI FARMACOLOGICA CONTRO LE REAZIONI AVVERSE DA MEZZO DI CONTRASTO IN PAZIENTI CON DIATESI ALLERGICA

GIORNO PRIMA DELL'ESAME :

Metilprednisolone 1 cp (4mg)	X 2 -----	1 cp h8-h16
Zirtec 1 cp (10mg)	-----	1 cp h 20
Ranitidina Cloridrato 1 cp (300)	-----	1 cp h 20

GIORNO DELL'ESAME :

Metilprednisolone 1 cp (4mg)	-----	1 cp h8
Zirtec 1 cp (10mg)	-----	1 cp h 8
Ranitidina Cloridrato 1 cp (300)	-----	1 cp h 8

In caso di reazioni avverse al mezzo di contrasto anche lievi assumere “zirtec 1cp(10mg)” 4h dopo dopo l'esame

- I pazienti con RINITE in corso ASMA : idrocortisone 200mg e subito prima dell'esame (30') in Radiologia .

AVVERTENZA :

Gentile Sig/Sig ra deve sapere che :

- I farmaci prescritti possono indurre sonnolenza , per questo motivo le consigliamo di non guidare.
- Puo' assumere normalmente i farmaci di cui fa abitualmente uso.
- Il giorno dell'esame deve essere a digiuno da almeno 4 ore , puo' bere acqua.

Per eventuali ulteriori informazioni o spiegazioni puo' contattare il suo MEDICO CURANTE