

<b>CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE N. 12 POSTI OSTETRICA –PROVA SCRITTA 11/02/2025</b>
A
Nello schema proposto dal WHO per l'identificazione delle donne con gravidanza a basso rischio, quale situazione clinica tra le sottoriportate non è segnalata nella parte anamnestica di "anamnesi generale"? <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diabete mellito insulino-dipendente</li><li>2. Diabete non insulino dipendente</li><li>3. Patologia renale</li><li>4. Patologia cardiaca</li></ol>
Riguardo al <i>Clostridium Tetani</i> , in una donna in gravidanza alla ventesima settimana è utile: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Non somministrare vaccino antitetanico e si possono somministrare immunoglobuline umane antitetaniche</li><li>2. Somministrare vaccino antitetanico e si possono somministrare immunoglobuline umane antitetaniche</li><li>3. Somministrare vaccino antitetanico e non si possono somministrare immunoglobuline umane antitetaniche</li><li>4. Non somministrare vaccino antitetanico e non si possono somministrare immunoglobuline umane antitetaniche</li></ol>
La morbilità è: <ol style="list-style-type: none"><li>1. La frequenza di una certa malattia</li><li>2. Sinonimo di mortalità</li><li>3. Presenza di fattori di rischio</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
Il calo ponderale fisiologico di un neonato si attesta intorno al: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2-4% del peso alla nascita</li><li>2. 4-5% del peso alla nascita</li><li>3. 7-10% del peso alla nascita</li><li>4. 10-15% del peso alla nascita</li></ol>
Per porre diagnosi di sindrome HELLP è necessario: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Riduzione delle piastrine</li><li>2. Aumento delle lattico-deidrogenasi</li><li>3. Aumento delle transaminasi</li><li>4. Tutte le precedenti risposte sono corrette</li></ol>
Chi è secondo le norme d'uso del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope l'incaricato della buona conservazione dello stesso? <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il direttore dell'unità operativa</li><li>2. Il responsabile dell'assistenza infermieristica/ostetrica</li><li>3. Gli operatori sanitari</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
La sepsi puerperale: <ol style="list-style-type: none"><li>1. E' la quarta causa di morte materna in Italia</li><li>2. E' la prima causa di morte materna in Italia</li><li>3. Non è causa di morte materna in Italia</li><li>4. E' la seconda causa di morte materna in Italia</li></ol>

<p>In caso di presentazione podalica è indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Visitare la donna e valutare un eventuale parto spontaneo</li><li>2. Aspettare l'insorgenza del travaglio spontaneo</li><li>3. Eseguire un taglio cesareo</li><li>4. Nessuna delle precedenti è corretta</li></ol>
<p>Quando viene usata la manovra di Brandt-Andrews:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Disimpegno delle spalle</li><li>2. Secondamento</li><li>3. Espulsione della testa fetale</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>La secrezione dei capezzoli è patologica quando:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. E' modesta e saltuaria</li><li>2. E' siero ematica</li><li>3. E' latte e legata al post-partum</li><li>4. E' correlata a stimolazioni sessuali ricorrenti</li></ol>
<p>Che cos'è la disuria?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Impossibilità a minzionare</li><li>2. Difficoltà a minzionare</li><li>3. Dolore alla minzione</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Quali sono le caratteristiche delle decelerazioni tardive:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Compaiono abbastanza frequentemente in un tracciato patologico</li><li>2. Sono rare e, quando presenti, si ripetono continuamente e sempre con la stessa forma</li><li>3. Si definiscono tardive perché iniziano sempre dopo la fine della contrazione</li><li>4. Compaiono nella fase finale del travaglio</li></ol>
<p>Le competenze dei professionisti sanitari non dovrebbero essere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Per schemi acquisiti</li><li>2. Tecniche</li><li>3. Di ricerca</li><li>4. Di governo clinico</li></ol>
<p>Tra le seguenti metodiche di diagnosi prenatale, quale viene eseguita in epoca gestazionale precoce?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Amniocentesi precocissima</li><li>2. Villocentesi</li><li>3. Fetoscopia</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Una gravida di 35 anni è ad altissimo rischio per lo sviluppo concorrente di neoplasie maligne :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Della cervice</li><li>2. Dell'ovaio</li><li>3. Del colon</li><li>4. Della vagina</li></ol>

<p>I valori di normalità di un PH da vena ombelicale si mantengono nel range di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 7,25-7,45</li><li>2. 7,20-7,25</li><li>3. 7,10-7,20</li><li>4. 7,00-7,10</li></ol>
<p>Il ferro è anche indicato come:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sideremia</li><li>2. Ferritina</li><li>3. Siderofillina</li><li>4. Tutte le precedenti</li></ol>
<p>quali delle seguenti posizioni materne favorisce la progressione del travaglio?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dorsale</li><li>2. Eretta</li><li>3. Asimmetrica</li><li>4. Litotomica</li></ol>
<p>Quale dei seguenti parametri non è valutato nell'indice di Bishop?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilatazione</li><li>2. Appianamento, consistenza e posizione del collo uterino</li><li>3. Livello della parte presentata</li><li>4. Liquido amniotico</li></ol>
<p>La profilassi delle convulsioni eclamptiche utilizza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il calcio antagonista</li><li>2. Diuretico</li><li>3. Diazepam</li><li>4. Magnesio</li></ol>
<p>In un neonato prematuro è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia</li><li>2. Un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo</li><li>3. Un monitoraggio continuo della temperatura</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>A norma del D.Lgs. 81/2008, la responsabilità della sicurezza dei lavoratori spetta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Al solo datore di lavoro</li><li>2. Al datore di lavoro e ai dirigenti</li><li>3. Ai dirigenti, ma non ai preposti</li><li>4. Al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti</li></ol>
<p>In quale di queste condizioni è controindicata la ventosa ostetrica?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nell'inerzia uterina</li><li>2. Nella rotazione sacrale dell'occipite fetale</li><li>3. Nella macrosomia fetale</li><li>4. Negli ostacoli meccanici alla progressione fetale</li></ol>

<p>L'epitelio che riveste la cervice uterina è:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Squamoso</li><li>2. Ghiandolare</li><li>3. Sieroso</li><li>4. Mucinoso</li></ol>
<p>Il segno della "tartaruga" è tipico di quale delle seguenti condizioni ostetriche:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prolasso di funicolo</li><li>2. Emorragia post partum</li><li>3. Distocia di spalla</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Nei fattori di rischio per le patologie del pavimento pelvico troviamo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menopausa</li><li>2. Isterectomia</li><li>3. Le alternative 1 e 2 sono entrambe corrette</li><li>4. Ipotiroidismo</li></ol>
<p>L'isterosuzione in caso di interruzione della gravidanza utilizza la cannula di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nelaton</li><li>2. Karman</li><li>3. Guedel</li><li>4. Mayo</li></ol>
<p>L'atosiban è:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Derivato alcaloide della segale cornuta</li><li>2. Antagonista recettoriale dell'ossitocina</li><li>3. Tutte le precedenti</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Quale manovra viene chiamata da alcuni autori quinta manovra di Leopold?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La manovra di Pinard</li><li>2. La manovra di Zangemeister</li><li>3. Il segno di Lorier</li><li>4. Il segno di Demelin</li></ol>
<p>Nelle donne in menopausa naturale la terapia estrogenica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deve essere alternata con un progestinico</li><li>2. Deve essere associata a un progestinico</li><li>3. Non ha bisogno di alcuna associazione con progestinico</li><li>4. Deve essere valutata riguardo agli effetti e in caso aggiungere un eventuale terapia progestinica</li></ol>