

**CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE N. 12 POSTI OSTETRICA –PROVA SCRITTA 11/02/2025**

**B**

Quanti sono gli stadi del travaglio di parto?

1. Due
2. Tre
3. Quattro
4. Sei

La prevalenza è:

1. Una misura di frequenza
2. Una misura di morbilità
3. Una misura di morbosità
4. Nessuna delle precedenti

Nei segni di presunzione di gravidanza si riscontrano tutti i seguenti eccetto uno: quale?

1. Fenomeni simpatici
2. Amenorrea
3. Aumento di volume dell'addome
4. Comparsa di zone di ipercromia cutanea

Quale tra questi non è un fattore di rischio prenatale di emorragia post partum?

1. Sovradistensione uterina
2. Etnia asiatica
3. Anomalie uterine (fibromi)
4. Sottopeso (BMI inferiore a 18,5)

Quale tra questi non è un caratteristico sintomo delle fratture coccigee?

1. La difficoltà alla defecazione
2. Il dolore in sede sacro-coccigea
3. L'impossibilità ad assumere la posizione seduta
4. L'impossibilità alla deambulazione

La ghiandola mammaria è:

1. Endocrina
2. Esocrina
3. Mucipara modificata
4. Alveolare semplice

In una paziente con preclampsia quali delle seguenti anomalie si riscontrano più frequentemente nell'esame delle urine?

1. Proteinuria
2. Ematuria
3. Chetonuria
4. Glicosuria

Tra le seguenti manovre quale è indicata nella distocia di spalla?

1. Rubin
2. Jacquimier
3. Tutte le precedenti
4. Nessuna delle precedenti

<p>La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Chiusura per prima intenzione</li><li>2. Chiusura per seconda intenzione</li><li>3. Chiusura per terza intenzione</li><li>4. Granulazione</li></ol>
<p>Cosa valuta il test di Coombs indiretto?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La presenza di anticorpi diretti contro gli eritrociti liberi nel siero</li><li>2. La presenza di emoglobina fetale</li><li>3. La presenza di monociti</li><li>4. La presenza di eritroblasti</li></ol>
<p>In un neonato con distress respiratorio si osserva:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici</li><li>2. Vomito e irregolarità dell'alvo</li><li>3. Acidosi metabolica</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Chi è tenuto a vidimare in ogni sua pagina il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direttore generale</li><li>2. Direttore amministrativo</li><li>3. Direttore sanitario</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Che cosa è l'asinclitismo?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Un'anomalia del bacino osseo</li><li>2. Deflessione dell'estremo cefalico</li><li>3. Inclinazione laterale dell'estremo cefalico</li><li>4. Nessuna delle precedenti è corretta</li></ol>
<p>L'IVG:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. È consentita solo se la donna è maggiorenne</li><li>2. Non può essere praticata contro il parere contrario del padre del concepito</li><li>3. Può essere praticata anche se il padre del concepito si oppone al trattamento</li><li>4. Deve essere in ogni caso autorizzata dal giudice</li></ol>
<p>Esistono varianti atipiche delle decelerazioni variabili?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. No, sono una invenzione-trabocchetto di chi ha fatto questo questionario</li><li>2. Sì, e hanno un significato prognostico sfavorevole</li><li>3. No, perché le varianti atipiche appartengono alle decelerazioni tardive e non peggiorano la prognosi</li><li>4. Sì, ma non hanno alcun significato</li></ol>
<p>Durante il travaglio fisiologico è opportuno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Consumare il consumo di piccoli pasti a basso contenuto di grassi</li><li>2. Rispettare assoluto digiuno</li><li>3. Infondere soluzione glucosata al 5%</li><li>4. Infondere soluzione fisiologica alternata a soluzione glucosata al 10%</li></ol>

LETTERA B prova sorteggiata

<p>Un modello semplice di attribuzione di competenza per l'ostetrica/o può identificare i livelli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dipendente o libera/o professionista</li><li>2. Junior e senior</li><li>3. Assunta/o a tempo determinato o a tempo indeterminato</li><li>4. Diplomata/o, con diploma universitario, con laurea triennale</li></ol>
<p>Per la patologia cervicale uterina l'esame di primo livello è:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La colposcopia</li><li>2. Il pap test</li><li>3. Il test per la chlamydia trachomatis</li><li>4. Biopsia cervicale</li></ol>
<p>Che cos'è l'anuria?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dolore alla minzione</li><li>2. Impossibilità a minzionare</li><li>3. Riduzione del volume urinario al di sotto dei 100ml/24h</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Quale delle seguenti manovre in caso di distocia di spalla sostituisce il diametro di impegno antero-posteriore con quello obliquo?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mc roberts</li><li>2. Jacquemier</li><li>3. Rubin II</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Quali tra questi non è un confondente per la diagnosi di livello della parte presentata?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tumore da parto</li><li>2. Cefaloematoma</li><li>3. Presentazione di Bregma</li><li>4. Asinclitismo</li></ol>
<p>La rianimazione fetale intrauterina prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'infusione rapida di liquidi per aumentare la perfusione placentare</li><li>2. La sospensione dell'infusione ossitocica</li><li>3. La modifica della posizione materna</li><li>4. Tutte le precedenti sono corrette</li></ol>
<p>Tra i fattori di rischio ed infortunistico rientrano:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gli incendi e le esplosioni</li><li>2. Le radiazioni infrarosse, ultraviolette e ionizzanti</li><li>3. La movimentazione manuale dei carichi</li><li>4. La gestione delle emergenze generali</li></ol>
<p>Il pavimento pelvico è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Una componente parietale ossea</li><li>2. Un supporto muscolare e connettivale</li><li>3. Una componente viscerale</li><li>4. Tutte le precedenti risposte sono corrette</li></ol>

LETTERA B prova sorteggiata

<p>I fibromi uterini durante la gravidanza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diminuiscono di dimensione</li><li>2. Aumentano di dimensione</li><li>3. Restano invariati</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Qual è l'indicazione all'utilizzo dell'atosiban?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alterazioni cardiotocografiche in travaglio dovute ad ipercinesia/ipertonia uterina</li><li>2. Minaccia di parto prematuro/pretermine</li><li>3. Tutte le precedenti</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>I follicoli ovarici sono contenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nell'ilo ovarico</li><li>2. Nella corticale</li><li>3. Nella midollare ovarica</li><li>4. Nel mesoovaio</li></ol>
<p>Per menopausa si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La cessazione del ciclo mestruale da almeno 12 mesi consecutivi</li><li>2. La cessazione del ciclo mestruale da 6 mesi consecutivi</li><li>3. La cessazione del ciclo mestruale da 18 mesi anche non consecutivi</li><li>4. Nessuna delle precedenti è corretta</li></ol>
<p>Durante la gravidanza il fibrinogeno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diminuisce</li><li>2. Aumenta</li><li>3. Resta stabile</li><li>4. Nessuna delle precedenti</li></ol>
<p>Che cosa è il partogramma?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Una rappresentazione grafica del secondo stadio del parto</li><li>2. Una rappresentazione grafica del terzo stadio del parto</li><li>3. Una rappresentazione grafica del travaglio di parto</li><li>4. Una rappresentazione grafica dettata dalle curve di Friedman</li></ol>